

Consentiment informat per a la vacunació de la grip

El personal de la UIB, especialment els que pertanyin a un grup de risc, estan inclosos en la campanya de vacunació de la grip. La immunització confereix títols protectors al 70-80% dels adults sans (la xifra és menor en malalts crònics), l'eficàcia és variable segons la composició, purificació i concentració, i redueix la incidència de la malaltia i la mortalitat associada.

La pauta de vacunació consisteix en l'administració d'una dosi de vacuna composta per virus fraccionats, que s'administra per via intramuscular o subcutània profunda, d'una suspensió composta de tres soques diferents de virus inactivats, adequades per a aquest any 2016.

1. Nom del medicament

Influvac suspensió injectable en xeringa precarregada (vacuna antigripal inactivada d'antígens de superfície). Campanya 2016-17.

2. Composició qualitativa i quantitativa

La composició antigènica recomanada per l'Organització Mundial de la Salut per a la temporada 2016-2017 a l'hemisferi nord és la següent:

- Soca anàloga a A/California /7/2009 (H1N1) pdm09
- Soca anàloga a A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)
- Soca anàloga a B/Brisbane/60/2008

3. Reaccions adverses

- Trastorns de la sang i del sistema limfàtic: Trombocitopènia transitòria, limfadenopatia transitòria.
- Trastorns del sistema immunològic: Reaccions al·lèrgiques que condueixen a xoc en molt rares ocasions, angioedema.
- Trastorns del sistema nerviós: Mal de cap,* neuràlgia, parestèsia, convulsions febrils, trastorns neurològics com ara encefalomièlitis, neuritis i síndrome de Guillain-Barré.
- Trastorns vasculars: Vasculitis relacionada en casos molt rars amb afectació renal transitòria. Trastorns de la pell i del teixit subcutani: Sudoració,* reaccions cutànies generalitzades que inclouen prujja, urticària o borradura inespecífica.
- Trastorns musculoesquelètics i del teixit connectiu: Miàlgia, artràlgia.*
- Trastorns generals: Febre, malestar, calfreds, cansament.*
- Reaccions locals: Envermelliment, inflamació, dolor, equimosi i induració.*

*Aquestes reaccions solen desaparèixer després d'1 o 2 dies sense tractament.

Embaràs:

Les vacunes antigripals inactivades es poden utilitzar en tots els estadis de l'embaràs. Es disposa de més dades de seguretat en el segon i tercer trimestre, en comparació amb el primer trimestre. No obstant això, les dades sobre l'ús de vacunes antigripals d'àmbit mundial no indiquen cap efecte advers fetal i maternal atribuïble a la vacuna.



Consentiment informat per a la vacunació de la grip

Nom i cognoms

DNI / Passaport

Data de naixement

He llegit el full d'informació que m'han lliurat. He rebut suficient informació sobre la vacunació.

He parlat amb:

DON el meu **CONSENTIMENT** per a la vacunació i respectaré les precaucions assenyalades. Sé que puc renunciar a la vacuna i també retirar aquest consentiment en qualsevol moment. Em proporcionaran una còpia d'aquest document si ho deman.

Firma del metge que informa,

Firma de la persona interessada,

Data:

He decidit **NO AUTORITZAR** l'administració d'aquesta medicació que m'han proposat.

Firma del metge que informa,

Firma de la persona interessada,

Data:

He decidit **REVOCAR** la meua **ANTERIOR AUTORITZACIÓ**.

Firma del metge que informa,

Firma de la persona interessada,

Data: